



Сезонний календар годівлі домашньої птиці для Харківщини: від березня до листопада

Автор: Мар'яна Швайко, к.е.н., співвласниця ФГ «Долгопол Н.В.»

Дата: березень 2026

Домашня птиця — основа продовольчої автономії для більшості сімей Золочівської громади. Кури, індоутки, гуси забезпечують яйця та м'ясо навіть тоді, коли магазини не працюють, а логістика повністю зруйнована. Але годувати птицю однаковим кормом цілий рік — серйозна помилка, яка коштує і здоров'я поголів'я, і грошей.

Харківщина має виражену континентальну сезонність: різка весна, спекотне літо (+35°C у тіні — норма для липня), сира осінь та тривала холодна зима. Кожен із цих періодів вимагає корекції раціону.

Чому сезонність критична саме на прикордонні?

В умовах війни ми не можемо замовити потрібний компонент «з доставкою завтра». Дорога з Харкова до Довжика — це ризик обстрілу, а кожна поїздка планується під «вікно безпеки». Тому сезонну заготівлю сировини потрібно робити заздалегідь, поки є можливість працювати в полі.

Таблиця 1. Сезонний календар потреб домашньої птиці (Харківщина)

| Період | Температура | Потреба в енергії | Потреба в білку | Потреба в мінералах | Ключова сировина для заготівлі |
|------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Березень—квітень | +2...+15°C | Висока | Підвищена | Висока (кальцій) | Озиме жито, залишки кукурудзи |
| Травень—червень | +15...+28°C | Середня | Висока | Середня | Свіжі трави, молода люцерна |
| Липень—серпень | +25...+38°C | Знижена | Середня | Дуже висока | Соняшник (макуха), крейда, сіль |
| Вересень—жовтень | +8...+20°C | Підвищена | Підвищена | Висока | Нове зерно пшениці, кукурудзи |
| Листопад—лютий | -5...+5°C | Дуже висока | Середня | Середня | Зернові запаси, висівки, макуха |

Весна (березень—квітень): старт яйценосності

Весною кури починають активно нестися. Це найвідповідальніший період: нестача кальцію призведе до тонкої шкаралупи або повного припинення несучості. Рекомендуємо збільшити частку вапнякового борошна до 4–5% та додати подрібнену яєчну шкаралупу. Енергетична цінність раціону має бути підвищеною — птиця витрачає ресурси на відновлення після зими.

Порада: саме у березні—квітні варто закупити або виготовити основний запас преміксу на весь рік, поки дороги ще відносно безпечні після зимового затишшя.

Літо (травень—серпень): спека та мінеральний стрес

При температурі вище +30°C птиця зменшує споживання корму на 15–25%. Це означає, що кожен грам корму має бути максимально поживним. Критична помилка — давати влітку той самий об'єм корму, що й взимку. Птиця просто не з'їдає його, корм псується, починаються кишкові хвороби.

Таблиця 2. Корекція раціону для спекотного періоду (липень—серпень)

| Компонент | Звичайна частка | Літня частка | Чому |
|--------------------------|-----------------|--------------|---|
| Зернова основа (пшениця) | 45–50% | 35–40% | Менше об'єму — більше концентрації |
| Макуха соняшникова | 10–15% | 18–22% | Білок та жири в компактній формі |
| Крейда / вапняк | 2–3% | 4–5% | Компенсація втрати мінералів через спрагу |
| Кухонна сіль | 0,3% | 0,5% | Електроліти при зневодненні |
| Свіжа зелень | за наявності | до 10% | Вітаміни + охолоджуючий ефект |

Важливо: влітку годуйте птицю рано-вранці (до 7:00) та ввечері (після 19:00), коли температура знижується. Вдень — лише доступ до чистої прохолодної води.

Осінь (вересень—жовтень): линька та підготовка до зими

Осінь — період линьки: птиця скидає старе пір'я та нарощує нове. Це вимагає підвищеного вмісту сірковмісних амінокислот та білка. Рекомендуємо збільшити частку соняшникового шроту до 20% та за можливості додати 3–5% м'ясо-кісткового борошна.

Осінь — також ідеальний час для заготівлі: нове зерно просушене, кукурудза зібрана, можна сформувати запас на всю зиму.

Зима (листопад—лютий): максимум енергії

Взимку птиця витрачає величезну кількість енергії на обігрів тіла. Раціон має бути максимально калорійним: збільшуємо частку кукурудзи до 40–45% (вона найбільш енергетична серед зернових), додаємо 2–3% рослинної олії для підвищення калорійності.

Таблиця 3. Орієнтовний зимовий раціон для курей-несучок (Харківщина)

| Компонент | Частка | Функція |
|----------------------------|----------|--------------------------------|
| Кукурудза подрібнена | 40–45% | Основне джерело енергії |
| Пшениця подрібнена | 15–20% | Енергія + білок |
| Макуха соняшникова | 15–18% | Білок + жири |
| Висівки пшеничні | 5–8% | Клітковина для травлення |
| Вапнякове борошно / крейда | 3–4% | Кальцій для шкаралупи |
| Премікс вітамінний | 1–2% | Вітаміни А, D, Е (немає сонця) |
| Сіль кухонна | 0,3–0,5% | Мінеральний баланс |

Головне правило: контролюйте вагу птиці. Якщо кури худнуть — збільшуйте калорійність. Якщо жиріють (несучість падає) — зменшуйте кукурудзу, додавайте пшеницю та висівки.



Контролюйте вагу птиці: худнуть — більше енергії, жиріють — менше кукурудзи. © 2026 MariAgro • www.mariagro.com.ua

Підсумок

Сезонна корекція раціону — це не розкіш, а необхідність, особливо в наших умовах. Невеликі зміни у складі корму по сезонах можуть підвищити яйценосність на 20–30%, знизити падіж молодняку та зекономити корм. MariAgro працює над тим, щоб наші комбікорми враховували саме ці сезонні особливості Слобожанщини.

© 2026 MariAgro / ФГ «Долгопол Н.В.» — www.mariagro.com.ua